Е.Н. Бирюк¹, Н.Н. Фурик¹, Д.П. Бажанов², К.К. Яцевич²,
С.Л. Василенко¹, С.Б. Борунова¹

¹РУП «Институт мясо-молочной промышленности»

²ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАКВАСОЧНЫХ ШТАММОВ ЛАКТОКОККОВ И ТЕРМОФИЛЬНЫХ СТРЕПТОКОККОВ ИЗ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Из природных источников изолированы 61 культура мезофильных и 7 культур термофильных молочнокислых бактерий. На основании характеристики морфологических, культуральных и физиолого-биохимических свойств все мезофильные изоляты были отнесены к подвиду *Lactococcus lactis* subsp. *lactis*, а термофильные бактерии идентифицированы как *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus*. Анализ нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК подтвердил результаты фенотипической идентификации.

По результатам проведенных исследований были отобраны 13 мезофильных и 2 термофильных изолята, перспективных для использования в качестве заквасочных культур.

Введение

Производство ферментированных молочных продуктов основано на использовании бактериальных заквасок (БЗ) и бактериальных концентратов (БК), которые могут включать в свой состав как микроорганизмы разных таксономических групп, так и монокультуры. Получение готовых продуктов с заданным комплексом свойств во многом определяется составом и свойствами применяемых микроорганизмов.

Для производства ферментированных молочных продуктов (в частности, творога, сметаны, ряда кисломолочных напитков и т. п.) используются бактериальные концентраты и закваски, в состав которых входят штаммы лактококков *Lactococcus lactis* subsp. *cremoris*, *Lactococcus lactis* subsp. *lactis*, *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* bv. *diacetylactis* и термофильного стрептококка *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus*. В составе БЗ и БК обычно используется от 3 до 7 штаммов *Lactococcus lactis* ssp. и от 1 до 3 штаммов *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus* [1].

Источниками выделения молочнокислых микроорганизмов в основном являются растения, фрукты, овощи, сырое молоко и молочные продукты, в том числе самоквасные. Очень важно правильно провести все этапы выделения и идентификации для определения видовой принадлежности бактерий, в дальнейшем планируемых для использования в качестве заквасок [3].

Селекция молочнокислых бактерий включает ряд этапов: отбор образцов, содержащих молочнокислые бактерии, и их обогащение молочнокислой микрофлорой; высеивание обогащенной культуры на плотную питательную среду и термостатирование посевов; выделение колоний в стерильное обезжиренное молоко и исследование выделенных изолятов по ряду признаков, позволяющих установить их принадлежность к тому или иному виду молочнокислых бактерий и их производственную ценность [3].

Традиционно идентификацию и классификацию молочнокислых бактерий проводили на основе изучения морфологических, физиологических и биохимических признаков [2]. В последние годы наряду с традиционными методами исследования для идентификации микроорганизмов используют изучение их геномных характеристик. В специализированных лабораториях, занимающихся выделением, изучением и отбором наиболее перспективных в производстве культур молочнокислых бактерий, применяют различные молекулярно-генетические методы, позволяющие устанавливать точную видовую принадлежность штаммов, а также типировать и паспортизировать производственные культуры [4, 5].

Наиболее универсальным молекулярно-генетическим методом, позволяющим проводить корректную генотипическую идентификацию бактериальных изолятов, является анализ нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК. Он рекомендован в качестве одного из стандартов и общепринят в наиболее авторитетных коллекциях культур микроорганизмов [6–8].

Изучение молочнокислых бактерий с использованием комплексного подхода к идентификации и оценке производственно-ценных свойств, включающее как классические микробиологические, так и современные молекулярно-генетические методы, дает возможность выделить штаммы, перспективные для использования в качестве заквасок.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования являлись изоляты молочнокислых микроорганизмов, выделенные из накопительных культур и планируемые для пополнения Централизованной отраслевой коллекции промышленных штаммов молочнокислых бактерий РУП «Институт мясо-молочной промышленности».

В работе использовали питательные среды: ВОМ-10 (10 %-е восстановленное молоко); лакмусовое молоко (в 1000 ± 10 см³ среды ВОМ-10, подогретой до 80 ± 2 °С добавляют стерильный раствор лакмуса до образования интенсивного фиолетового цвета); среда ГО (молоко, гидролизованное панкреатином или поджелудочной железой крупного рогатого скота); пастеризованное молоко – молоко, отвечающее требованиям СТБ 1598 для молока не ниже высшего сорта; агаризованная среда ГО (к приготовленному гидролизованному молоку добавляют агар-агар до концентрации 1,5 %); плотная питательная среда для выделения

ароматобразующих лактококков (гидролизованное молоко с 1 % лимоннокислого кальция и 1,5 % агара); среда M17 с аргинином.

Микроскопирование препаратов проводили по ГОСТ 10444.11.

Биохимическая идентификация проводилась с использованием тест-системы API-50CHL (bioMerieux, Франция) и программного обеспечения к ней API WEB.

Определение и анализ нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК проводили, придерживаясь ранее приведенных методик [9].

Результаты и их обсуждение

Для выделения молочнокислых бактерий, в частности, лактококков и термофильного стрептококка, использовали накопительные культуры, полученные из различных источников, включающие надземные части культурных растений, плоды, дикорастущие лиственные и хвойные растения и заложенные на хранение при температуре не выше $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ в Централизованной отраслевой коллекции промышленных штаммов молочнокислых бактерий (табл. 1).

В рамках проводимой работы были изучены культурально-морфологические и производственно-ценные свойства накопительных культур мезофильных и термофильных микроорганизмов (табл. 2–3).

В микроскопических препаратах накопительные культуры мезофильных микроорганизмов были представлены грамположительными кокками, расположенными поодиночке, парами или в цепочках. Исследуемые культуры сквашивали пастеризованное молоко в течение 5–5,5 ч. Культуры P5 и P68, не сформировавшие молочный сгусток в течение 6 ч, были исключены из дальнейшего исследования (см. табл. 2).

Нами также были исследованы пять накопительных культур термофильных молочнокислых бактерий (см. табл. 3). Четыре накопительные культуры, клетки которых представлены грамположительными цепочками кокков, сквашивали цельное молоко за 3–3,5 ч (при $42\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$). Одна культура термофильных бактерий формировала сгусток в пастеризованном цельном молоке за 6 ч (при $42\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$) и была исключена из дальнейших исследований.

На следующем этапе для получения изолятов был проведен рассев накопительных культур. Всего было получено 230 изолятов мезофильных и 20 изолятов термофильных молочнокислых микроорганизмов.

Полученные изоляты заквасочных культур изучали по культурально-морфологическим и производственно-ценным свойствам (форма и расположение клеток в микроскопическом препарате, фагочувствительность, способность сквашивать 10 %-е восстановленное молоко, газо- и ароматообразование). Все отобранные изоляты молочнокислых бактерий оказались фагоустойчивыми, за исключением штамма P62/9 б/з (фагочувствительность 35,7 %), который был исключен из дальнейших исследований.

Таблица 1. Источники выделения накопительных культур молочнокислых бактерий

№ п/п	Рабочий номер накопительной культуры	Наименование объекта для выделения	Географический пункт отбора образца
1	P1	сосна (хвоя)	Чернигов, Украина
2	P5	черника (листья)	Барселона, Испания
3	P50	плоды яблони	Дрогичин, Брестская обл.
4	P51	плоды яблони	Молодечно, Минская обл.
5	P54	плоды яблони	Дрогичин, Брестская обл.
6	P55	плоды груши	Молодечно, Минская обл.
7	P57	плоды груши	Щучин, Гродненская обл.
8	P59	плоды яблони	Янушковичи, Логойский р-н
9	P62	эхинацея (листья)	Янушковичи, Логойский р-н
10	P63	плоды яблони	Узда, Минская обл.
11	P68	донник белый (листья)	Нарочь, Минская обл.
12	P75	сосна (хвоя)	Нарочь, Минская обл.
13	P91	плоды яблони	Верхнедневинск, Витебская обл.
14	P92	плоды яблони	Браслав, Витебская обл.
15	P93	яблоко (антоновка)	Минск
16	P97	клюква (ягоды)	Высокая Гора, Пуховичский р-н
17	P98	плоды яблони	Богино, Витебская обл.
18	P99	виноград (ягоды)	Глуск, Могилевская обл.
19	P108	мох	Шацк, Минская обл.
20	P118	молоко	ГМЗ № 2, г. Минск
21	P126	ель (хвоя)	Залесье, Минский р-н
22	P129	лук (перо)	Лысовичи, Минская обл.
23	P130	роза (бутон)	Янушковичи, Логойский р-н
24	P133	плоды яблони	Лысовичи, Минская обл.
25	P134	плоды груши	Большие Пруссy, Копыльский р-н

Отбирали изоляты мезофильных микроорганизмов, сильных кислотообразователей, сквашивающих пастеризованное цельное молоко при 30 ± 2 °С в течение 5–6 ч (по результатам трех экспертиз). Слабые кислотообразователи (образцы P62/1 d, P62/2 d, P62/6 d, P62/7 d) формировали сгусток в стерильном молоке в течение 24 ч, а с основой - сильным кислотообразователем за 5,5–7,5 ч, при этом время окрашивания по щелочной пробе составило 5–8 мин. в обоих случаях.

Изоляты термофильных микроорганизмов сквашивали пастеризованное цельное молоко за 2,5–3,5 часа (при 42 ± 2 °С) и за 5,5–6,5 часов (при 30 ± 2 °С) (по результатам трех экспертиз).

Активность свертывания и органолептические свойства выделенных штаммов являются наиболее важными и решающими показателями, определяющими их пригодность для использования в производстве. Поэтому была изучена сквашивающая способность для 16 мезофильных

изолятов (по одному из каждого образца) на различных видах молочного сырья (цельное молоко, сливки, обезжиренное молоко) (рис. 1).

Таблица 2. Культурально-морфологические и производственно-ценные свойства накопительных культур мезофильных микроорганизмов

Рабочий номер культуры	Морфология клеток	Время сквашивания пастеризованного цельного молока, ч при 30±2 °С	Рост при 47±2°С	Определение образования диацетила, мин	Каталаза	Фаго-чувствительность, %
P1, P62, P118, P129, P133	грамположительные кокки, диплококки, короткие цепочки кокков	5	не растет	обр.	не обл.	0
P5, P68	грамположительные кокки, диплококки, короткие цепочки кокков	>6,5	не растет	не обр.	не обл.	0
P50, P51, P54, P55, P57, P59, P63, P75, P92, P93, P97, P98, P99, P108, P126, P130, P134	грамположительные кокки, диплококки, короткие цепочки кокков	5	не растет	не обр.	не обл.	0
P91	грамположительные кокки, диплококки, короткие цепочки кокков	5,5	не растет	не обр.	не обл.	0

Установлено, что для большинства изолятов сквашивающая активность цельного молока при 30±2°С составила 5 ч – 5 ч 30 мин, а обезжиренного молока – 5 ч 30 мин – 5 ч 45 мин, за исключением изолята P62/2 d, у которого время сквашивания цельного и обезжиренного молока составляет 6 ч 30 мин. Сливки, исследуемые изоляты, сквашивали в течение 5 ч 30 мин – 6 ч.

Для установления видовой принадлежности молочнокислых бактерий определяли следующие физиолого-биохимические характеристики изолятов: способность бактерий к росту при температурах 10 и 40 °С, способность бактерий к росту в лакмусовом молоке и в молоке с 0,1 % метиленовым голубым, способность бактерий к росту в среде с содержанием NaCl 2, 4 и 6,5 %, в среде с pH 9,2 и 9,6, способность бактерий образовывать NH₃ из аргинина, способность образовывать кислоту из сахаров.

Метаболизм сахаров у 13 изолятов мезофильных культур был изучен с использованием стрип-систем API 50 CH. Использование таких тест-систем позволяет быстро определить наличие сахаролитической реакции.

Результаты показали, что все изученные культуры обладают способностью утилизировать рибозу, галактозу, глюкозу, фруктозу, маннозу, лактозу, трегалозу, N-ацетил-глюкозамин, арбутин, салицин, целлобиозу, мальтозу. В то же время только некоторые из исследуемых изолятов ферментируют амигдалин, манит, гентобиозу. И только один

изолят (P62/2d) утилизирует сахарозу. Полученные данные говорят о гетерогенной сахаролитической активности исследуемых изолятов.

Таблица 3 – Культурально-морфологические и производственно-ценные свойства накопительных культур термофильных микроорганизмов

Рабочий номер культуры	Морфология клеток	Грампринадлежность	Время сквашивания пастеризованного цельного молока, ч при 42±2 °С	Наличие каталазы
P369	цепочки кокков	грамположительные	3,5 ч 30 мин	не обнар.
P409	кокки, диплококки, цепочки кокков	грамположительные	6 ч	не обнар.
P469, P472, P475	цепочки кокков	грамположительные	3 ч	не обнар.

Рис. 1. Сквашивающая способность изолятов мезофильных молочнокислых бактерий

Интерпретацию полученных данных осуществляли при помощи специального программного обеспечения АТВ-plus. По способности ферментировать сахара все исследуемые изоляты отнесены к подвиду *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* (табл. 4).

Нами также были изучены физиолого-биохимические характеристики термофильных молочнокислых бактерий. Согласно определителю Берджи бактерии вида *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus*, как и другие стрептококки, не способны расти при содержании в среде NaCl = 6,5 % и выше [10]. Согласно нашим данным

все исследуемые изоляты способны к росту на среде с 2 % NaCl и не растут на среде с 4 % и 6,5 % NaCl.

Таблица 4. Результаты идентификации изолятов мезофильных культур с помощью набора API 50 CH.

№ изолята	Оценка уровня идентификации	
	% id	T*
P 57/7	64,1	0,90
P 55/10	92,3	0,94
P 50/6	87,7	0,96
P 133/7	64,1	0,90
P 130/7	64,1	0,90
P 134/9	64,1	0,90
P 1/7-3	97,9	1,00
P 1/8-1	97,9	1,00
P 54/1	92,3	0,94
P 59/5	84,5	0,84
P 63/6	84,5	0,84
P 118/5	75,6	0,88
P 62/2d	92,5	0,94

Особенностью термофильного стрептококка является относительно слабо выраженная сахаролитическая активность: считается, что типичные штаммы этого вида сбраживают только лактозу, глюкозу, сахарозу и не ферментируют мальтозу, маннозу, манит, арабинозу, сорбит, ксилозу, галактозу и многие другие углеводы [10,11]. Все исследуемые нами из них за исключением 469/6-8, ферментировали галактозу, а четыре изолята ферментировали раффинозу. С другой стороны, изоляты 475/2-2, 475/2-5 и 469/6-8 не сбраживали глюкозу.

По совокупности культурально-морфологических и физиолого-биохимических характеристик все исследуемые изоляты термофильных молочнокислых бактерий отнесены к подвиду *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus*.

На следующем этапе наших исследований была проведена молекулярно-генетическая идентификация 15 изолятов с помощью анализа нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК, которая предусматривает определение таксономического положения идентифицируемого организма путем определения сходства между нуклеотидными последовательностями генов 16S рРНК идентифицируемых организмов и типовых, а также точно идентифицированных штаммов наиболее родственных видов или подвидов бактерий.

В результате молекулярно-генетического анализа 10 изолятов мезофильных лактококков идентифицированы как *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* (табл. 5). Изоляты P133/7, P134/9 и P63/6 по результатам оценки сходства нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК занимали

промежуточное положение между подвидами *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* и *Lactococcus lactis* subsp. *hordniae*. Два изолята термофильного стрептококка были идентифицированы как *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus* (см. табл. 5).

Таблица 5 - Идентификация исследуемых культур по результатам анализа генов 16S рНК.

Штамм (рабочее обозначение)	Идентификация по фенотипу	Протяженность участков секвенирования	Идентификация по результатам анализа генов 16S рНК
P133/7	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	498 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> или <i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>hordniae</i>
P57/7	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	500 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>
P134/9	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	443 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> или <i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>hordniae</i>
P55/10	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	498 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>
P54/1	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	422 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>
P51/9	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	493 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>
P50/6	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	770 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>
P63/6	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	495 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> или <i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>hordniae</i>
P59/5	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	499 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>
P118/5	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> bv. <i>diacetyactis</i>	500 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>
P1/8-1	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> bv. <i>diacetyactis</i>	501 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>
P1/7-3	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> bv. <i>diacetyactis</i>	500 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>
P62/2d	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> bv. <i>diacetyactis</i>	490 п.о.	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>
P475/2-5	<i>Streptococcus salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i>	500 п.о.	<i>Streptococcus salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i>
P469/6-8	<i>Streptococcus salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i>	500 п.о.	<i>Streptococcus salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i>

Вывод

В результате проведенных исследований выделены из природных источников 13 изолятов мезофильных и 2 изолята термофильных молочнокислых бактерий, перспективных для использования в качестве заквасочных культур. На основании характеристики культурально-морфологических и физиолого-биохимических свойств мезофильные изоляты были идентифицированы как *Lactococcus lactis* subsp. *lactis*, а все полученные термофильные бактерии – как *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus*. Оценка сходства нуклеотидных последовательностей генов 16S рНК полностью подтвердила результаты фенотипической идентификации термофильных бактерий и 10 мезофильных штаммов. Три мезофильных штамма по результатам генотипической идентификации занимали промежуточное положение между подвидами *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* и *Lactococcus lactis* subsp. *hordniae*.

Литература

1. Банникова, Л.А. Микробиологические основы молочного производства: Справочник / Л.А. Банникова, Н.С. Королева, В.Ф. Семенихина. – М.: Агропромиздат, 1987. – 400 с.
2. Банникова, Л.А. Селекция молочнокислых бактерий и их применение в молочной промышленности / Банникова, Л.А. // – Пищевая промышленность, 1975. – 255 с.
3. Ботина, С.Г. Видовая идентификация и паспортизация молочнокислых бактерий методами молекулярно-генетического типирования / С.Г. Ботина // Молочная промышленность. – 2008. – № 3. – С. 52–54.
4. Ботина, С.Г. Генетическое многообразие штаммов термофильных бактерий на территории стран СНГ / С.Г. Ботина [и др.] // Биотехнология. – 2004. – № 2. – С. 3–12.
5. Ботина, С.Г. Идентификация и характеристика отечественных штаммов термофильных молочнокислых бактерий: автореф. дис. канд. биол. наук: – М., 2004. – 22 с.
6. Определитель бактерий Берджи. / Под ред. Дж. Хоулта [и др.]– М.: «Мир», 1997. – Т. 2. – 368 с.
7. Stackebrandt E, Report of the ad hoc committee for the re-evaluation of the species definition in bacteriology. *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* 2002. 52: 1042-1047.
8. Teuber, M. The Genus *Lactococcus* / M. Teuber, A. Geis // In: *The Prokaryotes*. – M. Dworkin, S. Falkow, E. Rosenberg, K.-H. Schleifer, E. Stackebrandt, (Eds.), 3d ed., Springer-Verlag, New York, NY. – 2006. – P. 205–228.
9. Turenne C.Y., Tschetter L., Wolfe J. Necessity of Quality-Controlled 16S rRNA Gene Sequence Databases: Identifying Nontuberculous *Mycobacterium* Species // *Journal of Clinical Microbiology*. – 2001. – V. 39. – № 10. – P. 3637-3648.
11. Weisburg, W.G., 16S Ribosomal DNA amplification for phylogenetic study. // *J. Bacteriol.* – 1991. – V. 173. – № 2. – P. 697–703.

A. Biruk¹, N. Furik¹, D. Bazhanov², K. Yatsevich², S. Vasilenko¹, S. Barunova¹

¹*Institute of Meat and Dairy Industry*

²*Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences of Belarus*

OBTAINING OF STARTER CULTURES LACTOCOCCUS AND STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS FOR PRODUCTION BACTERIAL STARTER AND CONCENTRATES.

Summary

61 cultures of mesophilic and 7 cultures of thermophilic lactic acid bacteria were isolated from natural sources.

Based on the morphological, cultural and biochemical traits, all the mesophilic strains were identified as *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* and all the thermophilic bacteria were affiliated to *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus*. Analysis of 16S rRNA gene nucleotide sequences confirmed the results of phenotypic identification.

Candidate starter strains of 13 mesophilic and 2 thermophilic lactic acid bacteria were obtained in as a result of our research.